технопром

Тел.: 8 (495) 966-38-53

E-mail: info@vet-t.ru

Сайт: www.vet-t.ru



Динамично развивающийся коллектив профессионалов компании **ООО "Технопром"** удовлетворит ваши потребности в поставках ветеринарных препаратов и сопутствующих товаров в любой регион России. У нас в приоритете: высокое качество продукции, доступная цена и быстрая доставка.

Тел.: 8 (495) 966-38-53

E-mail: info@vet-t.ru

Сайт: www.vet-t.ru

Кормовой БЕТАИН (kormovoi Betain)

Кормовой БЕТАИН – кормовая добавка, применяемая для повышения сохранности продуктивности, профилактики нарушения обмена веществ у КРС, свиней и с/х птицы, а также для снижения влияния тепловых стрессовых факторов. Кормовой Бетаин вводят в комбикорма и премиксы на комбикормовых заводах, в кормоцехах хозяйств с использованием технологий смешивания или через систему водопоения на птичниках и свинокомплексах.

Способы применения и дозировка: препарат применяют групповым способом перорально, с водой для поения или в смеси с кормом.

• Для профилактики и в качестве натурального стимулятора роста: 0,5 л/1000 л воды в течение 5-7 суток. При необходимости профилактический курс повторить с интервалом раз в месяц по 5-7 суток в течение всего периода выращивания.

• Для лечения: 1 л/1000 л воды в течение 5-7 суток. После недельного перерыва можно возобновить лечебный курс, если есть показания.

• Для профилактики тепловых стрессов и увеличения сохранности в жаркий период: 0,5л/1000 л воды для поения в течение 5-7 суток, за 2 дня до начала жаркого периода. При необходимости курс увеличивают до 10-15 суток. После недельного перерыва курс выпойки можно повторить.

• Для снижения стресса при вакцинации, применении антибиотиков или кокцидиостатиков: 0,5 л/1000 л воды в течение 3 суток до стресса и 3 суток после него. При планируемой перегруппировке или транспортировке: 0,5 л/1000 л воды в течение 2 суток до стресса и 3 суток после него. Птице перед убоем для снижения потери веса: 0,5 л/1000 л воды в течение 3 суток до убоя.

Продукцию животноводства и птицеводства после применения Бетаина можно использовать в пищевых целях без ограничений.

Состав: натуральный бетаин – 32%, сырой протеин – 25%, натуральный комплекс витаминов, аминокислот, макро- и микроэлементов: вит.В4 – 7,2%, вит.С – 2,1%, вит.В2 – 0,22%, Медь – 8,7%, Калий – 5,4%, Кобальт – 4,8%, Натрий – 0,76%, Магний – 0,2%, Цинк – 0,2%, Кальций – 0,25%, Марганец – 0,15%, Сера – 0,24%, Фосфор - 0,02%, Метионин – 4,6%, Цистеин – 1,9%, Глутаминовая кислота – 1,1%, Треонин – 1%, Лизин – 0,8%, Аспарагиновая кислота – 0,99%, Пролин – 0,98%, Аланин – 0,94%, Серин – 0,54%, Триптофан – 0,5%, Гистидин – 0,49%, Глицин – 0,47%, Фенилаланин – 0,1%, а также вспом-е вещества, свекловичная меласса и вода до 100%.

Срок годности: 36 мес. при соблюдении условий хранения – в закрытой упаковке, в сухом, темном месте, при t от -10°С до 30°С, не более 180 дней после вскрытия упаковки.

Упаковка: канистра 5 л из полиэтилена высокой плотности

Организация-разработчик: ООО «Агросельхоз», г. Москва

Организация-дистрибьютор компании-разработчика: ООО «Технопром», г. Москва

Тел.: 8 (495) 966-38-53

E-mail: info@vet-t.ru

Сайт: www.vet-t.ru

АКВАКОЛИ (Aquacoli)

АКВАКОЛИ – антибактериальный препарат широкого спектра действия для лечения и профилактики желудочно-кишечных заболеваний бактериальной этиологии у сельскохозяйственных животных, в том числе птицы. Препарат назначают с лечебно- профилактической целью при колибациллезе, сальмонеллезе, бактериальных энтеритах и неспецифической диарее у сельскохозяйственных животных и птицы.

Способы применения и дозировка:
АКВАКОЛИ применяют перорально с водой для поения или в смеси с жидким кормом в течение 3-5 суток, индивидуально или групповым способом в следующих дозах:
• Птица (бройлеры, индюки, ремонтный молодняк): 125-250 мл на 1000 л питьевой воды
• Ягнята, телята и козлята (в возрасте до 8 недель): 0,25 мл на 10 кг массы тела
• Свиньи: 0,25 мл на 10 кг массы тела или 250-500 мл на 1000 л воды
• При групповом способе применения животные должны получать только воду, содержащую препарат (лечебный раствор готовят ежедневно).
Убой животных и птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 3 суток после последнего применения препарата (мясо животных до истечения 3 суток, может быть использовано в корм животным или для переработки на мясокостную муку).

Состав: АКВАКОЛИ оральный раствор, в 1 мл содержит действующего вещества: колистина сульфат 4 000 000 МЕ, а также вспомогательные вещества и воду до 1 мл

Срок годности: 2 года со дня производства при соблюдении условий хранения – хранят Акваколи в плотно закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 5°С до 25°С.

Упаковка: канистра 5 л из полиэтилена высокой плотности

Организация-разработчик: ООО «Научно-производственная фирма «Алиса», г. Москва
Организация-производитель: АО завод «Ветеринарные препараты», г. Гусь-Хрустальный
Организация-дистрибьютор компании-разработчика: ООО «Технопром», г. Москва
Тел.: 8 (495) 966-38-53
E-mail: info@vet-t.ru
Сайт: www.vet-t.ru

ГИДРОДОКСИВЕТ (Hydrodoxivet)

ГИДРОДОКСИВЕТ – комбинированный антибактериальный препарат для лечения и профилактики бактериальных инфекций телят, ягнят, козлят, свиней и с/х птицы. Входящие в состав препарата активные компоненты обеспечивают широкий спектр антимикробного действия в отношении грам+ и грам- микроорганизмов.

Способы применения и дозировка:
ГИДРОДОКСИВЕТ применяют при респираторных и желудочно-кишечных заболеваниях бактериальной этиологии, в том числе, пастереллезе, микоплазмозе, колибактериозе, сальмонеллезе, дизентерии, энзоотической пневмонии и др. инфекциях, возбудители которых чувствительны к доксициклину и тилозину. Препарат применяют животным и птице перорально в следующих дозах:

• Телятам (до 3-х мес. возраста): 0,25 мл/10 кг ассы тела раз в сутки в течение 3-5 дней.
• Домашней птице (цыплятам, бройлерам, индюкам): 0,5 л/1000 л питьевой воды в течение 3-5 дней (вода с препаратом - единственный источник питья).
• Свиньям: 0,25 мл/10 кг. Массы тела или 0,5 л/1000 л питьевой воды раз в сутки в течение 3-5 дней.

Убой птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 7 суток; свиней – 8 суток; телят, ягнят и козлят – 14 суток после последнего применения препарата (мясо до истечения этих сроков может быть использовано в корм животным или для переработки на мясокостную муку).

Состав: Оральный р-р, в 1 мл. **ГИДРОДОКСИВЕТА** содержится: доксициклина – 200 мг., тилозина тартрат – 100 мг., а также вспомогательные вещества и вода до 1 мл.

Срок годности: 2 года со дня производства при соблюдении условий хранения – **ГИДРОДОКСИВЕТ** хранят в закрытой упаковке отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищенном от света мест, при температуре от 5°С до 25°С.
Упаковка: канистра 5 л из полиэтилена высокой плотности
Организация-разработчик: ООО «Научно-производственная фирма «Алиса», г. Москва
Организация-производитель: АО завод «Ветеринарные препараты», г. Гусь-Хрустальный
Организация-дистрибьютор компании-разработчика: ООО «Технопром», г. Москва
Тел.: 8 (495) 966-38-53
E-mail: info@vet-t.ru
Сайт: www.vet-t.ru

ФУРАМЕД 20% (Furamed)

ФУРАМЕД 20% применяют для лечения и профилактики заболеваний бактериальной этиологии у телят, ягнят, козлят, свиней, сельскохозяйственной птицы, собак и кошек. Препарат назначают при заболеваниях: трихомонозе, гистомонозе, дизентерии, диарее, колите, стоматите, а также при заболеваниях органов дыхания, мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта и кожи, вызванных микроорганизмами, чувствительными к метронидазолу.

Способы применения и дозировка:
ФУРАМЕД 20% применяют животным индивидуально с водой для поения в течение 3-5 дней в следующих дозах:
• КРС: 0,5 мл/10 кг массы тела 2 раза в день в течение 3 дней.
• Свиньи: при балантидиозе – 0,5 мл препарата на 10 кг массы животного или 0,5 л/1000 л воды 2 раза в день в течение 3 дней; при дизентерии – 1 мл/10 кг массы животного или 1л/1000 л воды раз в день в течение 4 дней.
• Гуси, утки, индейки, куры при гистомонозе и цыплята-бройлеры при трихомонозе: 1 мл/10 кг массы птицы или 1 мл/1 л воды, в течение 5 дней для лечения или 3 дней для профилактики.
Убой животных на мясо разрешается через 5 суток, использование молока – через 36 часов после применения препарата.

Состав: ФУРАМЕД 20% оральный раствор, в 1 мл содержит: метронидазола 200 мг, вспомогательные вещ-ва, воду до 1 мл.

Срок годности: 2 года со дня производства при соблюдении условий хранения – **ФУРАМЕД** 20% хранят в закрытой упаковке в сухом, темном месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 5°С до 25°С.

Упаковка: канистра 5 л из полиэтилена высокой плотности

Организация-разработчик: ООО «Научно-производственная фирма «Алиса», г. Москва
Организация-производитель: АО завод «Ветеринарные препараты», г. Гусь-Хрустальный
Организация-дистрибьютор компании-разработчика: ООО «Технопром», г. Москва
Тел.: 8 (495) 966-38-53
E-mail: info@vet-t.ru
Сайт: www.vet-t.ru

ЭНКОЛИ 10% (Encoli)

ЭНКОЛИ 10% – комплексный антибактериальный препарат для лечения и профилактики болезней бактериальной и микоплазменной этиологии у сельскохозяйственных животных и птицы.

Способы применения и дозировка:
ЭНКОЛИ 10% назначают телятам, ягнятам, свиньям и с/х птице при респираторных и желудочно-кишечных заболеваниях, колибактериозе, сальмонеллезе, стрептококкозе, некротичском энтерите, гемофиллезе, микоплазмозе, смешанных и вторичных инфекциях, возбудители которых чувствительны к энрофлоксацину и колистину. Препарат применяют животным и птице перорально раз в сутки в течение 3-5 дней, в следующих дозах:

• Свиньям, телятам, ягнятам: 0,3 мл/1 кг массы тела или 0,35 л/1000 л воды, выпаивая с водой для поения.
• Бройлерам, племенной птице, ремонтному молодняку кур, родительскому бройлерному стаду и мясным индейкам: 0,1 мл на 1 кг живой массы или 0,5 л/1000 л воды для поения (в период лечения птица должна получать только воду, содержащую лекарственный препарат).
Убой птицы на мясо разрешается через 11 суток; телят, ягнят и свиней – через 14 суток после последнего применения препарата.

Состав: ЭНКОЛИ 10% оральный раствор, в 1 мл содержит: энрофлоксацин – 100 мг, колистина сульфат – 1 млн МЕ, триметоприм – 50 мг, а также вспомогательные вещества и вода до 1 мл.

Срок годности: 2 года со дня производства при соблюдении условий хранения – **ЭНКОЛИ** хранят в закрытой упаковке в сухом, темном месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 5°С до 25°С.

Упаковка: канистра 5 л из полиэтилена высокой плотности

Организация-разработчик: ООО «Научно-производственная фирма «Алиса», г. Москва
Организация-производитель: АО завод «Ветеринарные препараты», г. Гусь-Хрустальный
Организация-дистрибьютор компании-разработчика: ООО «Технопром», г. Москва
Тел.: 8 (495) 966-38-53
E-mail: info@vet-t.ru
Сайт: www.vet-t.ru

ДОКСИКОЛИВЕТ 20% (Doxycolivet)

ДОКСИКОЛИВЕТ 20% - комплексный антибактериальный препарат для лечения и профилактики респираторных и желудочно-кишечных инфекций у сельскохозяйственной птицы, телят и свиней. Препарат применяют для лечения заболеваний: пневмоний бактериальной этиологии, колибактериоза, сальмонеллеза, микоплазмоза, гемофиллеза и др. заболеваний свиней, КРС, МРС и птицы.

Способы применения и дозировка:
ДОКСИКОЛИВЕТ 20% оральный раствор применяют животным индивидуально или групповым способом с водой для поения (или молоком) в следующих дозах:
• Птица: 0,5 л на 1000 л воды в течение 3-5 дней.

Запрещается использование препарата курам-несушкам!
Свиньи: 0,75-1 л на 1000 л воды или 0,5-1 мл на 10 кг массы животного с питьевой водой два раза в сутки в течение 3-5 дней
Телята: 0,5-1 мл на 10 кг массы животного с питьевой водой два раза в сутки в течение 3-5 дней.
Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток после последнего применения препарата (мясо животных до 14 суток может быть использовано в корм животным или для переработки на мясокостную муку).

Состав: ДОКСИКОЛИВЕТ 20% оральный раствор, в 1 мл содержит действующих веществ: доксициклин 200 мг, колистина сульфат 1 млн МЕ, а также вспомогательные вещества и вода до 1 мл

Срок годности: 2 года со дня производства при соблюдении условий хранения – хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, темном месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 5°С до 25°С.

Упаковка: канистра 5 л из полиэтилена высокой плотности
Организация-разработчик: ООО «Научно-производственная фирма «Алиса», г. Москва
Организация-производитель: АО завод «Ветеринарные препараты», г. Гусь-Хрустальный
Организация-дистрибьютор компании-разработчика: ООО «Технопром», г. Москва
Тел.: 8 (495) 966-38-53
E-mail: info@vet-t.ru
Сайт: www.vet-t.ru

ФЛОРЕКС 20% (Florex)

ФЛОРЕКС 20% применяют для лечения и профилактики респираторных инфекций у сельскохозяйственной птицы и свиней.
Препарат относится к антибактериальным лекарственным средствам широкого спектра действия и применяется для лечения и профилактики колибактериоза, сальмонеллеза, пастереллеза и микоплазмоза птицы; плевропневмонии, пастереллеза, бордетеллиоза, гемофиллеза свиней.

Способы применения и дозировка:
Препарат вводят перорально с водой для поения животных в следующих дозах:
• Птице старше 4-х недель: 1л/1000 л воды в течение 3 дней, а при сальмонеллезе в течение 5 дней.
• Цыплятам в возрасте до 4 недель: 0,5 л/1000 л воды в течение 3-5 дней.
• Свиньям: 0,5 л/1000 л воды в сутки в течение 5-7 дней. В период лечения птица и свиньи должны получать только воду. Содержащую лекарственный препарат!
Запрещается применение препарата курам-несушкам!
Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 6 суток после применения препарата (до этого времени мясо может использоваться в корм зверям или для переработки в мясокостную муку).

Состав: ФЛОРЕКС 20% оральный раствор, в 1 мл содержит: флорфеникол 200 мг, а также вспомогательные вещества и воду до 1 мл.

Срок годности: 2 года со дня производства при соблюдении условий хранения – хранят в закрытой упаковке, в сухом, темном месте, отдельно от продуктов питания и кормов при t от 5°С до 25°С.

Упаковка: канистра 5 л из полиэтилена высокой плотности

Организация-разработчик: ООО «Научно-производственная фирма «Алиса», г. Москва
Организация-производитель: АО завод «Ветеринарные препараты», г. Гусь-Хрустальный
Организация-дистрибьютор компании-разработчика: ООО «Технопром», г. Москва
Тел.: 8 (495) 966-38-53
E-mail: info@vet-t.ru
Сайт: www.vet-t.ru

ТИЛТИАМ (Tiltiam)



ТИЛТИАМ – комплексный антибактериальный препарат, применяемый для профилактики и лечения птицы при заболеваниях: бронхитом, микоплазмозом, эшерихиозом, пастереллезом, заболеваниях пищеварительного тракта и органов дыхания; для лечения свиней при заболеваниях: рожей, дизентерией, илеитом, лептоспирозом, листериозом, колибактериозом, пастереллезом, сальмонеллезом, энтеритами, колитами, АРТ, АПП.

Способы применения и дозировка:
ТИЛТИАМ применяют животным индивидуально или групповым способом с водой для поения:
• Свиньи: 0,8 мл препарата на 10 кг массы тела или 0,8 л на 1000 л воды в сутки в течение 3-5 суток. Через 8-10 дней повторить курс лечения.
• Птица (куры, индюки, гуси, утки): 1 л препарата на 1000 л воды в течение 3-5 суток. Для молодняка птицы (в качестве профилактики): 0,5 л препарата на 1000 л воды с 1 по 5-е, а затем с 18-х по 20-е сутки жизни.
Аэрозольно применяют из расчета: 1 мл на 10 м.кв. (время экспозиции 30 мин) 2-3 суток подряд. Убой животных и птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 10 суток после последнего применения препарата.

Состав: ТИЛТИАМ оральный раствор, в 1 мл содержит: тиамулин 145 мг, тилозина тартрат 105 мг, а также вспомогательные компоненты и воду до 1 мл.

Срок годности: 24 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения – **ТИЛТИАМ** хранят в закрытой упаковке, в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от
5°С до 25°С.

Упаковка: канистра 5 л из полиэтилена высокой плотности

Организация-разработчик: ООО «Научно-производственная фирма «Алиса», г. Москва
Организация-производитель: АО завод «Ветеринарные препараты», г. Гусь-Хрустальный
Организация-дистрибьютор компании-разработчика: ООО «Технопром», г. Москва
Тел.: 8 (495) 966-38-53
E-mail: info@vet-t.ru
Сайт: www.vet-t.ru

Вакцина инактивированная, субъединичная
для профилактики репродуктивно-респираторного синдрома свиней (PPCC-FREE)

Вакцина РРСС вызывает формирование иммунного ответа к возбудителю репродуктивно-респираторного синдрома свиней через две недели после двукратной вакцинации продолжительностью не менее 6 месяцев. **Вакцина РРСС-Фри** уникальна – она объединяет гены двух штаммов РРСС – североамериканского и европейского.

Способ применения и дозировка: Вакцину вводят двукратно, внутримышечно, в дозе 2 см. куб. в область верхней трети шеи, за ухом. Вакцинации подлежат свиноматки за 8 и 5 недель до опороса, а также поросята 3 и 6 недельного возраста.

Запрещено вакцинировать клинически больных или ослабленных животных!

Состав: РРСС антиген PE-PQAB-K13, РРСС антиген PE-RSAB-K13, РРСС антиген PE-DGD-K13, РРСС антиген PE-M12-K13. В качестве адъюванта используется масло ISA-206 - 15% от объема с добавлением раствора мочевины (96мг) и формальдегида до 0,1% (в качестве вспомогательных веществ).

Срок годности: 36 мес. при соблюдении условий хранения – вакцину хранят и транспортируют в сухом темном месте при температуре от 4°С до 8°С.

Замораживание вакцины не допускается!
Упаковка: стеклянные флаконы по 100 мл (50 доз)
Производитель: Ребер Генетикс (Тайвань)
Тел.: 8 (495) 966-38-53
E-mail: info@vet-t.ru
Сайт: www.vet-t.ru

ООО «Технопром»

Тел.: 8 (495) 966-38-53
E-mail: info@vet-t.ru
Сайт: www.vet-t.ru

г. Москва, Леснорядский пер., д.10, стр.2